

Klinische Ergebnisse (alle unserer Patientinnen)

1: Individueller Gesundheitsstatus (angegeben als Punktwert zwischen 0- 100):

vor Eingriff	3 Mon. nach Eingriff	6 Mon. nach Eingriff
Durchschnittswert: 64,32	Durchschnittswert: 65,86	Durchschnittswert: 78,2
schlecht: 12%	schlecht: 4,3%	schlecht: 5%
sehr gut: 28%	sehr gut: 39,1%	sehr gut: 75%

0 = schlecht; 100 = sehr gut

2: Schmerzhafter Periode:

vor Eingriff	3 Mon. nach Eingriff	6 Mon. nach Eingriff
Durchschnittswert: 3,0	Durchschnittswert: 1,81	Durchschnittswert: 1,67
keine Schmerzen: 8%	keine Schmerzen: 18,1%	keine Schmerzen: 65%
starke Schmerzen: 40%	starke Schmerzen: 27,2%	starke Schmerzen: 10%

1 = keine Schmerzen; 5 = sehr starke Schmerzen

3: Aktivitäten eingeschränkt:

vor Eingriff	3 Mon. nach Eingriff
Durchschnittswert: 1,8	Durchschnittswert: 2,0
ja: 28%	ja: 4,5%
etwas: 28%	etwas: 31,8%
nein: 32%	nein: 45,4%

1 = ja; 2 = etwas; 3 = nein

Diese Auswertung basiert auf allen Patientinnen, die im Klinikum Stuttgart 2009 und 2010 mit einer Myomembolisation behandelt wurden.

Weitere Ergebnisse zur Entwicklung der körperlicher Fitness, zur Reduktion der Menstruationsschwere, usw. können Sie gerne individuell telefonisch abfragen.