

Informationen zur Covid-Auffrischimpfung

Die STIKO empfiehlt für die folgenden Indikationsgruppen eine Auffrischimpfung:

1. Personen im **Alter ≥ 60 Jahren**
2. Personen im Alter ≥ 6 Monaten, die aufgrund einer **Grundkrankheit** (siehe unten*) besonders gefährdet sind, schwer an COVID-19 zu erkranken
*Übersicht zu Grundkrankheiten, die ein besonderes Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf darstellen können:
 - Chronische Erkrankungen der Atmungsorgane (z. B. COPD)
 - Chronische Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenerkrankungen
 - Diabetes mellitus und andere Stoffwechselerkrankungen
 - Adipositas
 - ZNS-Erkrankungen, wie z. B. chronische neurologische oder neuromuskuläre Erkrankungen,
 - Demenz oder geistige Behinderung, psychiatrische Erkrankungen oder zerebrovaskuläre Erkrankungen
 - Krebserkrankungen
 - Personen mit angeborener oder erworbener Immunschwäche bzw. Personen, die eine immunsupprimierende Behandlung erhalten oder Immunmodulatoren einnehmen
 - Trisomie 21
3. **Personal in medizinischen Einrichtungen und in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen mit direktem PatientInnen- bzw. BewohnerInnenkontakt**
4. **Familienangehörige und enge Kontaktpersonen von Personen, bei denen durch eine COVID-19-Impfung vermutlich keine schützende Immunantwort erzielt werden kann**

Der Herbst ein günstiger Zeitpunkt für die Impfung, da Atemwegsinfektionen üblicherweise in der kalten Jahreszeit gehäuft auftreten. Die Impfung kann gleichzeitig mit der Grippeimpfung durchgeführt werden.